

Cuidado de los sitios de fijación de los clavos (Fijador externo o dispositivo Ilizarov)

Limpie los sitios de fijación de los clavos al menos dos veces al día o cuando sea necesario para ayudar a mantenerlos limpios y sin infecciones.

¿Cómo cuida los sitios de fijación?

Reúna estos materiales:

- Jabón líquido antibacterial como Dial™.
- Cepillo de dientes extra suave. Comience con un cepillo de dientes nuevo y úselo solamente para el cuidado de los sitios de fijación de los clavos.
- Hisopos de algodón como Q-Tips™.
- Pomada Bactroban®.
- Trozo de gasa.



Comience el cuidado de los sitios de fijación de los clavos al tercer día después de que su hijo haya salido del hospital. **Realice estos cuidados dos veces al día. Siga siempre estos pasos:**

1. Lávese las manos con agua y jabón.
2. Lave el brazo o pierna de su hijo con el jabón líquido antibacterial. En lugar de esto, su hijo puede bañarse (ducharse) usando el mismo jabón.
3. Si los sitios de fijación de los clavos presentan costras, use el cepillo de dientes extra suave para limpiar suavemente alrededor de los clavos o de los alambres.
4. Enjuague con agua el jabón del sitio de fijación de los clavos. Deje que se seque al aire.
5. Aplique la pomada Bactroban® con un hisopo de algodón limpio en cada sitio en donde haya un clavo o alambre.
6. Si estos sitios están drenando o supurando, use un trozo de gasa como vendaje alrededor de los clavos o alambres. Si no drenan ni supuran, deje los sitios de fijación de los clavos o alambres expuestos al aire.
7. Lávese las manos con agua y jabón.

Instrucciones especiales

Cuando limpie los sitios de fijación de los clavos o alambres, esté alerta de alguna señal de infección:

- Más enrojecimiento o hinchazón de la piel que rodea los clavos o alambres.
- Secreción de los clavos o alambres que no se detiene y que en el vendaje es mayor al tamaño de una moneda de 25 centavos.
- Más costras o levantamiento (abultamiento) de la piel alrededor de los clavos o alambres.
- Dolor en el sitio de fijación de los clavos que no mejora o que empeora.
- Temperatura de 101.5° F (38.3° C) o superior que no sea producto de otra enfermedad.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualesquier preguntas o inquietudes o si su hijo:

- Presenta alguna señal de infección;
- Tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.