

### Irse a casa con medicamento (Tabla para el medicamento)

- Puede tomar acetaminophen (Tylenol) cada 4–6 horas. Lea todas las etiquetas de los medicamentos para asegurarse de no tomar más de un medicamento que contenga acetaminophen a la vez.
- A la mayoría de los niños se les receta narcóticos, como oxycodone, cuando tienen dolor intenso. Si el oxycodone también contiene acetaminophen indicado en la etiqueta del medicamento, no administre más acetaminophen durante 4 horas. Si tiene preguntas, hágaselas al farmacéutico.
- Si tiene preguntas sobre este u otro medicamento, hable con su médico.

#### Día 1

<i>Nombre del medicamento</i>	<i>Dosis</i>	<i>Puede darlo cada</i>	<i>Hora en que se le dio</i>						

#### Día 2

<i>Nombre del medicamento</i>	<i>Dosis</i>	<i>Puede darlo cada</i>	<i>Hora en que se le dio</i>						

#### Día 3

<i>Nombre del medicamento</i>	<i>Dosis</i>	<i>Puede darlo cada</i>	<i>Hora en que se le dio</i>						

**Día 4**

<b>Nombre del medicamento</b>	<b>Dosis</b>	<b>Puede darlo cada</b>	<b>Hora en que se le dio</b>					

**Día 5**

<b>Nombre del medicamento</b>	<b>Dosis</b>	<b>Puede darlo cada</b>	<b>Hora en que se le dio</b>					

**Día 6**

<b>Nombre del medicamento</b>	<b>Dosis</b>	<b>Puede darlo cada</b>	<b>Hora en que se le dio</b>					

**Día 7**

<b>Nombre del medicamento</b>	<b>Dosis</b>	<b>Puede darlo cada</b>	<b>Hora en que se le dio</b>					