

## **Sedación para tratamiento dental**

El tratamiento dental de su hijo está programado para el (fecha) \_\_\_\_\_ a las (hora) \_\_\_\_\_ en el Centro Dental de Children's Hospital of Wisconsin.

Llegue 15 minutos antes de la hora programada de la cita. Usted (uno de los padres o tutor) debe acompañar a su hijo a la consulta y debe permanecer hasta que termine el tratamiento.

Se administrará un medicamento para ayudar a que su hijo se relaje durante el tratamiento. Es importante seguir estas indicaciones el día y la noche antes del tratamiento. El medicamento que se administra es: \_\_\_\_\_.

### **Comida y bebida**

No permita que su hijo ingiera ningún tipo de alimento ni productos lácteos (de leche) después de la medianoche anterior al tratamiento. Su hijo puede beber hasta 4 onzas de líquidos claros antes del tratamiento. **Su hijo no debe de consumir nada por 4 horas antes del tratamiento.**

**Entre los líquidos claros se encuentran:** el agua, el jugo de manzana, la gelatina como la marca Jell-O® y las paletas de hielo como Popsicles®.

Si sigue fielmente este programa, habrá un menor riesgo relacionado con la sedación para su hijo. También mejorará el resultado de la sedación.

### **Cambios en el estado de salud**

Informe sobre cualquier cambio en el estado de salud de su hijo que ocurra dentro de los 7 días previos a la cita.

### **Medicamentos**

Converse con el médico de su hijo acerca de darle los medicamentos que toma a diario el día del tratamiento.

### **Después del tratamiento**

El dentista de su hijo se reunirá con usted para analizar el tratamiento y lo que debe esperar que suceda en casa. Asegúrese de hacer cualquier pregunta que pueda tener.

- Volver a casa después del tratamiento
  - Recibirá instrucciones por escrito que deberá seguir. Llame al dentista si tiene preguntas.
  - Se tiene que llevar a su hijo a casa en un automóvil. Su hijo debe sentarse en un asiento de seguridad para automóvil o estar sujeto con el cinturón de seguridad para la vuelta a casa. No use el autobús para llevar al niño a casa.
  - Vigile a su hijo detenidamente cuando esté en casa en busca de señales de problemas. Observe si existe hemorragia que no se pueda controlar, problemas de respiración o dolor que no se puede aliviar.

- Actividades
  - Es posible que su hijo esté cansado o somnoliento después del tratamiento. Déjelo descansar.
  - Asegúrese de que su hijo duerma de lado con la cabeza de costado para proteger las vías respiratorias y prevenir ronquidos.
  - Revise con frecuencia a su hijo para saber si duerme y respira normalmente.
- Dieta
  - Empiece con líquidos claros (jugo de manzana, caldos, gelatina como Jell-O®, y paletas de hielo como Popsicles®). Ofrezcale con frecuencia pequeñas cantidades para evitar molestias estomacales.
  - Cuando el niño se sienta bien después de tomar líquidos claros, ofrezcale alimentos suaves como sopa o pasta.
  - **No le dé** leche ni productos lácteos durante un día después del tratamiento.
  - Regrese lentamente a la dieta normal en 1 ó 2 días.
- Fiebre
  - Su hijo puede tener una temperatura de hasta 101° F (38° C) el primer día después del tratamiento.
  - Si es necesario, puede usar acetaminofeno (Tylenol®).
  - Anime al niño a tomar líquidos para ayudarlo a aliviar la fiebre.

**ALERTA:** Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier consulta o inquietud o si su hijo:

- tiene vómitos que no mejoran después de 4 horas;
- tiene una temperatura superior a 101° F (38° C);
- tiene problemas para respirar;
- siente un dolor que no responde al acetaminofeno (Tylenol®), o al ibuprofen (Motrin or Advil);
- presenta hemorragia que no se detiene después de 10 minutos;
- tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.

Centro Dental de Children's (414) 266-2040

- Si la clínica no está abierta y necesita hablar con el dentista, llame al (414) 266-2000 y pida que lo comuniquen con el dentista que está de guardia.

**Esta hoja informativa fue creada para ayudarlo a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el tratamiento y el control o seguimiento.**