

Dolores de cabeza de rebote por medicamentos

¿Qué es un dolor de cabeza de rebote por medicamentos contra el dolor?

En general estos dolores de cabeza ocurren diariamente. Es el resultado del uso frecuente de demasiados medicamentos contra el dolor.

Los medicamentos contra el dolor pueden ser:

- Sin receta médica. Los más comunes son el acetaminofeno (Tylenol®) o el ibuprofeno (Motrin® o Advil®).
- Con receta.

¿Cuál es la causa?

Cuando un medicamento contra el dolor se toma todos los días o se usa con mucha frecuencia, puede empeorar un dolor de cabeza o dificultar su tratamiento. Si su hijo ha tenido dolor de cabeza durante más de algunos meses, consulte con su proveedor de servicios de salud. Ellos querrán saber cuántos medicamentos contra el dolor ha estado tomando y con qué frecuencia.

¿Cómo se siente?

La descripción y ubicación del dolor en la cabeza puede ser diferente en cada persona. Este tipo de dolor no presenta molestias estomacales ni empeora con las luces o el ruido. Con el tiempo, el dolor puede empeorar y el medicamento que se usa para tratarlo puede dejar de hacer efecto. El proveedor de servicios de salud de su hijo conversará con usted sobre la manera de dejar de usar los medicamentos contra el dolor para estos dolores de cabeza. Puede tardar semanas o meses para que este tipo de dolor desaparezca. A medida que su hijo gradualmente deje de tomar estos medicamentos contra el dolor, podría sentirse peor antes de comenzar a sentirse mejor.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier consulta o inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.



Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el tratamiento y el control o seguimiento.