

Uso de la oxycodona líquida

¿Qué es la oxycodona?

La oxycodona es un medicamento contra el dolor opiode muy fuerte. Opiode es otro nombre para narcótico. Se debe usar sólo después de haber intentado otros métodos de control del dolor.

- La oxycodona se le debe dar a su hijo si tiene mucho dolor que no se puede controlar con acetaminofén, ibuprofeno u otros métodos.
- No se debe necesitar la oxycodona por más de unos cuantos días.

El acetaminofén (Tylenol®) y el ibuprofeno (Motrin® o Advil®) son medicamentos contra el dolor muy buenos. Pídale al médico información sobre cómo usarlos.

¿Cuáles son los efectos secundarios?

- Aumento de la somnolencia o problemas para respirar. **Llame al 911 si su hijo está demasiado adormilado, no se despierta fácilmente, tiene problemas para respirar o cara o labios hinchados.**
- Movimientos o pensamiento lento. Tenga precaución cuando su hijo necesite estar alerta.
- Salpullido o urticaria. Deje de darle este medicamento y llame al médico de su hijo.
- Comezón. Llame al médico de su hijo.
- Malestar estomacal. Dele este medicamento con alimentos.
- Estreñimiento. Vea las hojas educativas: Tratamiento del dolor en casa y Estreñimiento.
- Problemas para hacer pipí (orinar). Llame al médico de su hijo.

¿Cómo administro este medicamento?

- Lea el frasco del medicamento antes de dárselo.
- Sólo dele oxycodona si su hijo está despierto, alerta y tiene mucho dolor.
- Nunca despierte a su hijo para darle opioides.
- Siga las indicaciones de su médico. Nunca le dé el medicamento más seguido de lo que le diga el doctor. Agítelo bien antes de usarlo.

Use una jeringa oral para medir el medicamento. **Pídale una al farmacéutico.**





La dosis de su hijo es _____ mL = _____ mg.

Esta dosis se basa en el peso de su hijo.

- Separe las partes de la jeringa y lávelas con agua tibia después de cada uso. Deje que se sequen al aire.
- Si su hijo todavía tiene mucho dolor después de tomar el medicamento, llame al médico.

Escriba la hora a la que le dio el medicamento. Es posible que no necesite todos los recuadros.

Día 1						
Día 2						
Día 3						

Jeringa de 1 mL	
Jeringa de 3 mL	
Jeringa de 5 mL	
Jeringa de 10 mL	

¿Cómo uso, almaceno y desecho este medicamento?

- Mantenga los medicamentos contra el dolor en un lugar seguro. Todos los medicamentos se deben guardar en un gabinete bajo llave. Sólo las personas que necesitan administrar estos medicamentos deben saber en dónde están. Incluso, un adulto debe darles este medicamento a los adolescentes.
- Nunca comparta medicamentos con receta con otras personas. Esto es peligroso. Puede causar daños graves y muertes. Es también contra la ley.
- Deshágase de la oxicodona que no use. No la guarde.

- Cuando su hijo ya no necesite este medicamento, llévalo a un lugar donde se puedan regresar medicamentos recetados (drug take-back). Algunas farmacias y estaciones de policía aceptan medicamentos de sobra. El sitio web Dose of Reality: <https://bit.ly/2Hqp0hz> lo puede ayudar a encontrar un lugar para regresarlos.
- No los tire en el lavabo, escusado ni basurero.

Otras hojas de enseñanza que pueden ser de ayuda

- Seguridad con los opioides #[1118](#)
- Tratamiento del dolor en casa #[1763](#)
- Cómo leer jeringas orales E[1619](#)
- Estreñimiento #[1844](#)

ALERTA: Llame al 911 si su hijo está demasiado adormilado, no se despierta fácilmente, tiene problemas para respirar o cara o labios hinchados. Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier otra inquietud.

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.